

LATHUND STÄDRUTINER FÖR MOTTAGNINGAR < 4 TIM

Typ av smitta Städ Desinfektion Avfall/tvätt	Normal (inklusive ESBL-bildande E coli)	Hepatit B, C, HIV	MRSA, VRE, ESBL-carba, ESBL-bildande klebsiella, multiresistenta pseudomonas och acinetobacter	Diarrésjukdomar samt Clostridioides difficileorsakad diarré	Virusorsakad gastroenterit, vinterkräksjuka/calici
Punktdesinfektion	Alkoholbaserad ytdesinfektion.	Alkoholbaserad ytdesinfektion. Vid större blödning Virkon 1 % av praktiska skäl.	Alkoholbaserad ytdesinfektion.	Alkoholbaserad ytdesinfektion.	Alkoholbaserad ytdesinfektion.
Patientnära ytor (t ex brits, kudde, avlastningsytor, undersökningsmaterial) Utförs mellan varje patient	Alkoholbaserad ytdesinfektion.	Alkoholbaserad ytdesinfektion.	Alkoholbaserad ytdesinfektion eller Virkon 1 %. Virkon 1 % till golv vb. Toaletten städas om den har använts. Dubbelstädning vid VRE.	Virkon 1 %. Virkon 1 % till golv vb. Toaletten städas om den har använts med Virkon 1 %.	Virkon 1 %, även till handfat. Virkon 1 % till golv vb. Toalett städas om den har använts med Virkon 1 %.
Avfall	Konventionellt avfall.	Konventionellt avfall. Avfall förorenat med större mängder blod = smittförande avfall.	Konventionellt avfall. Avfallspåsen knyts ihop inne på rummet.	Konventionellt avfall. Avfallspåsen knyts ihop inne på rummet.	Konventionellt avfall. Avfallspåsen knyts ihop inne på rummet.
Tvätt	Konventionell tvätt.	Konventionell tvätt. Tvätt förorenat med större mängder blod = risktvätt.	Konventionell tvätt. Tvättsäcken försluts på rummet.	Konventionell tvätt. Tvättsäcken försluts på rummet.	Konventionell tvätt. Tvättsäcken försluts på rummet.