

Dokumentnamn: Risktvätt	Revision: 03
Dokumenttyp: 8.5.0.1.1-5 rutin	Dokumentnummer: 24-586
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Programområde/Funktionsområde: LSG Patientsäkerhet
Dokumentansvarig: LSG Patientsäkerhet	Beslut av: Hygienläkare
Beslut datum: 2018-10-01	Nästa revidering: 2026-04-01

Risktvätt

Med risktvätt som kräver separat hantering avses inom Region Blekinge och Region Kronoberg:

- Textilier som blivit förorenade med cytostatika från injektions- eller infusionslösning
- Textilier som blivit förorenade med utsöndringar från patient minst 7 dygn* efter senaste cytostatikainjektionen/-infusionen.
- Textilier som av Smittskyddsenheten/Vårdhygien anses utgöra smittrisk efter vård/undersökning/behandling av särskilt smittsam patient. Dessa omhändertas enligt individuell anvisning utfärdad av smittskyddsenhet/Vårdhygienisk expertis i samråd med hygienansvarig inom Textilia

Hantering

- Lägg tvätten i vattenlöslig plastsäck
- Fyll inte säcken mer än till 2/3
- Förslut säcken med de knytband som finns på säcken.
- Den vattenlösliga plastsäcken läggs i en gul plastsäck märkt risktvätt
- Förslut säcken på vanligt sätt med förslutningsband

* Mer detaljerad information om utsöndringstid finns ofta i FASS, i cytostatikamaterialer och i särskilda broschyrer från läkemedelstillverkarna.